

Краткое справочное руководство

Набор реагентов для выявления антигена SARS-CoV-2 (метод коллоидного золота)

Sinocare®

1. Подготовка



Зонд с ватным тампоном для взятия мазка из носоглотки



Пробирка с буфером



Пробирка для разведения биологического образца



Лунка для образца
Тест-полоска

2. Этапы работы



Во время работы используйте средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, хирургические маски, лабораторные халаты и защитные очки.



Достаньте тест-полоску из пакета из фольги и приготовьтесь к тесту.




Добавьте 10 капель буфера вертикально в пробирку для разведения биологического образца.




Извлеките зонд с ватным тампоном из упаковки. Примечание: Не следует прикасаться к наконечнику (тампону) зонда и не следует извлекать зонд из упаковки до взятия пробы.



Наклоните голову пациента назад на примерно на 70°.



Вставьте зонд с ватным тампоном в носоглотку (см. Рис. 4.3). Проведите зондом с ватным тампоном по внутренней стенке каждой ноздри не менее 5 раз. Сбор образца должен занимать примерно 15 секунд.



Медленно извлеките тампон.



Вставьте зонд с ватным тампоном в раствор в пробирку для разведения биологического образца, вращая его вблизи к внутренней стенке пробирки в течение 10 раз, а затем подержите зонд с ватным тампоном в растворе в течение 1 минуты, чтобы максимально экстрагировать образец.



Для получения максимального количества жидкости из тампона, извлеките зонд, одновременно сжимая его наконечник (тампон) стенками пробирки.



Закройте пробирку крышкой и осторожно встряхните ее, чтобы остаточная жидкость на стенке пробирки полностью смешалась с жидкостью в пробирке.




Поместите тест-полоску горизонтально на чистый и плоский стол. Переверните пробирку для разведения биологического образца так, чтобы крышка пробирки оказалась внизу и, держа пробирку вертикально, добавьте 2 капли (около 80 ± 5 мкл) в лунку для образца тест-полоски.




После выполнения теста вымойте руки водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство для рук. Примечание: использованные материалы для теста должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами.

3. Интерпретация результатов


Линия контроля (C)



Линия теста (T)



Положительный



Недействительный

Отрицательный

Подождите 15-20 минут и интерпретируйте результаты. Результаты недействительны, если они появились более чем через 20 минут.